陆家嘴国泰人寿
Cathay Lujiazui Life Insurance

# V2钻体检套餐

根据第三方服务机构业务调整，具体体检项目以实际到检落地为准

| 体检项目 | | 临床意义 | 男 | 女未婚 | 女已婚 |
|---|---|---|---|---|---|
| **一般检查** | 身高、体重、体重指数、血压、脉搏 | 体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等 | √ | √ | √ |
| **内科** | 心肺听诊、腹部触诊 | 心肺有无异常　肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | √ | √ | √ |
| **外科** | 淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、前列腺、肛门指检、 | 淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | √ | √ | √ |
| **妇科（已婚项目）** | 常规检查 | 女性生殖器有无异常病变，有无宫颈及阴道感染 | | | √ |
| | 白带常规 | | | | √ |
| | TCT液基薄层细胞学检测 | 宫颈癌筛查 | | | √ |
| **眼科** | 外眼 | 视力是否正常，眼外观是否正常，有无沙眼、结膜炎等 | √ | √ | √ |
| | 视力 | | | | |
| | 眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | √ | √ | √ |
| | 裂隙灯 | 检查眼角膜和晶状体有无病变（如白内障）等 | √ | √ | √ |
| **耳鼻喉检查** | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽（如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大）有无异常等 | √ | √ | √ |
| **心电图** | 十二导联心电图 | 用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | √ | √ | √ |
| **血常规-3分类** | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。 | √ | √ | √ |
| **尿常规** | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐等 | 可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | √ | √ | √ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **肝功能11项** | 血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清γ-谷氨酰基转移酶测定、血清碱性磷酸酶测定、血清总蛋白测定、血清白蛋白测定、血清球蛋白、白蛋白/球蛋白、血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定、 | 可提示肝胆系统疾病：急性传染性肝炎，中毒性肝炎，脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等。 | √ | √ | √ |
| **肾功能3项** | 血清尿素测定、血清肌酐测定、血清尿酸测定 | 可提示有无肾功能损害：如慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结核，肾肿瘤，尿毒症等。 | √ | √ | √ |
| **血脂** | 1.血清总胆固醇测定 | 脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等 | √ | √ | √ |
| | 2.血清甘油三脂测定 | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因 | √ | √ | √ |
| | 3.血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化 | √ | √ | √ |
| | 4.血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素 | √ | √ | √ |
| **糖尿病相关项目** | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | √ | √ | √ |
| | 糖化血红蛋白 | 可反映检查前1-2个月的血糖水平，是糖尿病的筛查指标 | √ | √ | √ |
| **胸片** | 胸部正位检查 | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | √ | √ | √ |
| **彩色多普勒超声** | 肝胆脾胰肾 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。 | √ | √ | √ |
| | 前列腺 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤 | √ | | |
| | 乳腺 | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌 | | √ | √ |
| | 子宫及附件 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊 | | √ | |
| | 阴超 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊 | | | √ |
| **营养早餐** | 营养早餐 | | √ | √ | √ |
| **电子报告** | | | √ | √ | √ |

注：美年落地肝功能十一项替换成肝功能七项，无血清高密度脂蛋白胆固醇测定、血清低密度脂蛋白胆固醇测定、糖化血

# V3钻体检套餐

根据第三方服务机构业务调整，具体体检项目以实际到检落地为准

| 体检项目 | | 临床意义 | 男 | 女未婚 | 女已婚 |
|---|---|---|---|---|---|
| **一般检查** | 身高、体重、体重指数、血压、脉搏 | 体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等 | √ | √ | √ |
| **内科** | 心肺听诊、腹部触诊 | 心肺有无异常　肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | √ | √ | √ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **外科** | 淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、前列腺、肛门指检、 | 淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | √ | √ | √ |
| **妇科（已婚项目）** | 常规检查 | 女性生殖器有无异常病变，有无宫颈及阴道感染 | | | √ |
| | 白带常规 | | | | √ |
| | TCT液基薄层细胞学检测 | 宫颈癌筛查 | | | √ |
| **眼科** | 外眼 | 视力是否正常，眼外观是否正常，有无沙眼、结膜炎等 | √ | √ | √ |
| | 视力 | | | | |
| | 眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | √ | √ | √ |
| | 裂隙灯 | 检查眼角膜和晶状体有无病变（如白内障）等 | √ | √ | √ |
| **耳鼻喉检查** | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽（如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大）有无异常等 | √ | √ | √ |
| **心电图** | 十二导联心电图 | 用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | √ | √ | √ |
| **血常规-3分类** | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。 | √ | √ | √ |
| **尿常规** | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐等 | 可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | √ | √ | √ |
| **肝功能11项** | 血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清γ-谷氨酰基转移酶测定、血清碱性磷酸酶测定、血清总蛋白测定、血清白蛋白测定、血清球蛋白、白蛋白/球蛋白、血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定、血清间接胆红素 | 可提示肝胆系统疾病：急性传染性肝炎，中毒性肝炎，脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等。 | √ | √ | √ |
| **肾功能3项** | 血清尿素测定、血清肌酐测定、血清尿酸测定 | 可提示有无肾功能损害：如慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结核，肾肿瘤，尿 | √ | √ | √ |
| **血脂** | 1.血清总胆固醇测定 | 脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等 | √ | √ | √ |
| | 2.血清甘油三脂测定 | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因 | √ | √ | √ |
| | 3.血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化 | √ | √ | √ |
| | 4.血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素 | √ | √ | √ |
| **糖尿病相关** | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | √ | √ | √ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目** | 糖化血红蛋白 | 可反映检查前1-2个月的血糖水平，是糖尿病的筛查指标 | √ | √ | √ |
| **肿瘤四项** | 甲胎蛋白检测定性 | 可提示有无原发性肝癌，生殖腺胚胎性肿瘤，肝硬化等。 | √ | √ | √ |
| | 癌胚抗原检测定性 | 为广谱肿瘤标志物，可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | √ | √ | √ |
| | 总前列腺特异性抗原测定 | 前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大，前列腺炎时也可见血清PSA水平 | √ | | |
| | 游离前列腺特异性抗原测 | | √ | | |
| | 糖链抗原125测定（女） | 是一种卵巢癌相关的肿瘤标志物 | | √ | √ |
| | 糖链抗原153测定（女） | 是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物 | | √ | √ |
| **CT** | 胸部CT | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | √ | √ | √ |
| **彩色多普勒超声** | 肝胆脾胰肾 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。 | √ | √ | √ |
| | 前列腺 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | √ | | |
| | 乳腺 | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。 | | √ | √ |
| | 子宫及附件 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊 | | √ | |
| | 阴超 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊 | | | √ |
| | 动脉硬化检测 | 了解动脉硬化情况，对动脉硬化进行定性、筛查 | √ | √ | √ |
| **营养早餐** | 营养早餐 | | √ | √ | √ |
| **电子报告** | | | √ | √ | √ |

# V4钻体检套餐

根据第三方服务机构业务调整，具体体检项目以实际到检落地为准

| 体检项目 | | 临床意义 | 男 | 女未婚 | 女已婚 |
|---|---|---|---|---|---|
| **一般检查** | 身高、体重、体重指数、血压、脉搏 | 体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等 | √ | √ | √ |
| **内科** | 心肺听诊、腹部触诊 | 心肺有无异常　肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | √ | √ | √ |
| **外科** | 淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、前列腺、肛门指检、 | 淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | √ | √ | √ |
| **妇科（已婚项目）** | 常规检查 | 女性生殖器有无异常病变，有无宫颈及阴道感染 | | | √ |
| | 白带常规 | | | | √ |
| | TCT液基薄层细胞学检测 | 宫颈癌筛查 | | | √ |
| | HPV核酸检测（16/18分型） | 宫颈癌筛查的重要指标 | | | √ |
| **眼科** | 外眼 | 视力是否正常，眼外观是否正常，有无沙眼、结膜炎等 | √ | √ | √ |
| | 视力 | | √ | √ | √ |
| | 眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | √ | √ | √ |
| | 眼压 | 了解眼压是否正常，眼压高可能患有青光眼病 | √ | √ | √ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 裂隙灯 | 检查眼角膜和晶状体有无病变（如白内障）等 | √ | √ | √ |
| **耳鼻喉检查** | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽（如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大）有无异常等 | √ | √ | √ |
| **心电图** | 十二导联心电图 | 用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | √ | √ | √ |
| **血常规-3分类** | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。 | √ | √ | √ |
| **尿常规** | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐等 | 可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | √ | √ | √ |
| **肝功能11项** | 血清总蛋白测定、血清白蛋白测定、血清球蛋白、白蛋白/球蛋白、血清丙氨酸氨基转氨酶测定、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、天门冬氨酸/丙氨酸氨基转移酶、血清总红胆素测定、血清直接胆红素测定、血清间接胆红素、血清碱性磷酸酶测定、血清胆碱酯酶测定、血清γ-谷氨酰基转移酶测定、血清乳酸脱氢酶测定、腺苷脱氨酶 | 可提示肝胆系统疾病：急性传染性肝炎，中毒性肝炎，脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等。 | √ | √ | √ |
| **肾功能** | 血清尿素测定 | | √ | √ | √ |
| | 血清肌酐测定 | | √ | √ | √ |
| | 血清尿酸测定 | 可提示：嘌呤代谢有无异常如高尿酸血症、痛风及肾脏功能损害 | √ | √ | √ |
| **血脂** | 1.血清总胆固醇测定 | 脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等 | √ | √ | √ |
| | 2.血清甘油三脂测定 | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因 | √ | √ | √ |
| | 3.血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化 | √ | √ | √ |
| | 4.血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素 | √ | √ | √ |
| | 6.血清载脂蛋白A1测定 | 载脂蛋白A1水平与冠心病呈负相关； | √ | √ | √ |
| | 7.血清载脂蛋白B测定 | 载脂蛋白B与动脉粥样硬化呈正相关； | √ | √ | √ |
| **糖尿病相关项目** | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | √ | √ | √ |
| | 糖化血红蛋白 | 可反映检查前1-2个月的血糖水平，是糖尿病的筛查指标 | √ | √ | √ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **甲状腺功能5项** | 血清三碘甲状腺原氨酸测定、血清甲状腺素测定、血清促甲状腺激素测定、血清游离甲状腺素测定、血清游离三碘甲状腺原氨酸 | 诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病 | √ | √ | √ |
| **心肌酶3项** | 血清肌酸激酶测定、血清乳酸脱氢酶测定、血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | | √ | √ | √ |
| | 超敏C反应蛋白 | | √ | √ | √ |
| **肿瘤八项** | 甲胎蛋白检测定性 | 可提示有无原发性肝癌，生殖腺胚胎性肿瘤，肝硬化等。 | √ | √ | √ |
| | 癌胚抗原检测定性 | 为广谱肿瘤标志物，可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | √ | √ | √ |
| | 总前列腺特异性抗原测定 | 前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大，前列腺炎时也可见血清PSA水平 | √ | | |
| | 游离前列腺特异性抗原测 | | √ | | |
| | 糖链抗原125测定（女） | 是一种卵巢癌相关的肿瘤标志物 | | √ | √ |
| | 糖链抗原153测定（女） | 是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物 | | √ | √ |
| | 糖链抗原199测定 | 是一种与胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的肿瘤标志物 | √ | √ | √ |
| | 糖链抗原50测定 | 胰腺癌、结肠癌等胃肠道恶性肿瘤时可见升高 | √ | √ | √ |
| | 细胞角蛋白19片段测定 | 是非小细胞肺癌（NSCLC）的鉴别诊断，疗效监测和预后判断的重要指标 | √ | √ | √ |
| | 糖链抗原724测定 | 时胃肠道恶性肿瘤标志物，检测胃癌的指标之一，但胃肠道良性疾病也可 | √ | √ | √ |
| **彩色多普勒超声** | 肝胆脾胰肾 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。 | √ | √ | √ |
| | 甲状腺 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤 | √ | √ | √ |
| | 前列腺 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | √ | | |
| | 乳腺 | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。 | | √ | √ |
| | 子宫及附件 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊 | | √ | |
| | 颈动脉彩超 | 了解颈部血管病变，狭窄程度、颈动脉硬化和颈动脉血流情况 | √ | √ | √ |
| | 阴道（已婚项目） | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊 | | | √ |
| **CT** | 胸部CT | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | √ | √ | √ |
| **动脉硬化检测** | | 了解动脉硬化情况，对动脉硬化进行定性、筛查 | √ | √ | √ |
| 胃功能3项 | 胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ、胃蛋白酶原比值（计算值） | 检测胃粘膜功能是否正常，是否受损。判断患胃病（如萎缩性胃炎、消化性溃疡、糜烂性胃炎及胃癌）的风险 | √ | √ | √ |
| 胃泌素-17 | | G-17可以直接评估胃窦部粘膜的健康状况和间接反映胃体部粘膜的健康状况，同时可以反映胃酸水平的高低，从而对胃部疾病风险进行有效评估 | √ | √ | √ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **胃幽门螺杆菌** | 胃幽门螺杆菌抗体(血液) | 判断胃内有无该细菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系 | √ | √ | √ |
| 骨密度检测 | | 诊断骨质疏松，预测骨折危险性 | √ | √ | √ |
| **营养早餐** | 营养早餐 | | √ | √ | √ |
| **电子报告** | | | √ | √ | √ |

# V5钻体检套餐

根据第三方服务机构业务调整，具体体检项目以实际到检落地为准

| 体检项目 | | 临床意义 | 男 | 女未婚 | 女已婚 |
|---|---|---|---|---|---|
| **一般检查** | 身高、体重、体重指数、血压、脉搏 | 体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等 | √ | √ | √ |
| **内科** | 心肺听诊、腹部触诊 | 心肺有无异常　肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | √ | √ | √ |
| **外科** | 淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、前列腺、肛门指检、 | 淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | √ | √ | √ |
| **妇科（已婚项目）** | 常规检查 | 女性生殖器有无异常病变，有无宫颈及阴道感染 | | | √ |
| | 白带常规 | | | | √ |
| | TCT液基薄层细胞学检测 | 宫颈癌筛查 | | | √ |
| | HPV核酸检测（16/18分型） | 宫颈癌筛查的重要指标 | | | √ |
| **眼科** | 外眼 | 视力是否正常，眼外观是否正常，有无沙眼、结膜炎等 | √ | √ | √ |
| | 视力 | | √ | √ | √ |
| | 眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | √ | √ | √ |
| | 眼压 | 了解眼压是否正常，眼压高可能患有青光眼病 | √ | √ | √ |
| | 裂隙灯 | 检查眼角膜和晶状体有无病变（如白内障）等 | √ | √ | √ |
| **心电图** | 十二导联心电图 | 用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | √ | √ | √ |
| **耳鼻喉检查** | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽（如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大）有无异常等 | √ | √ | √ |
| **血常规-3分类** | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。 | √ | √ | √ |
| **尿常规** | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐等 | 可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱 | √ | √ | √ |
| **尿微量白蛋白/尿肌酐** | | 肾脏早期损伤的指标 | √ | √ | √ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **肝功能15项** | 血清总蛋白测定、血清白蛋白测定、血清球蛋白、白蛋白/球蛋白、血清丙氨酸氨基转氨酶测定、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、天门冬氨酸/丙氨酸氨基转移酶、血清总红胆素测定、血清直接胆红素测定、血清间接胆红素、血清碱性磷酸酶测定、血清胆碱酯酶测定、血清γ-谷氨酰基转移酶测定、血清乳酸脱氢酶测定、腺苷脱氨酶 | 可提示肝胆系统疾病：急性传染性肝炎，中毒性肝炎，脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等。 | √ | √ | √ |
| **肾功能** | 血清尿素测定 | | √ | √ | √ |
| | 血清肌酐测定 | | √ | √ | √ |
| | 血清尿酸测定 | 可提示：嘌呤代谢有无异常如高尿酸血症、痛风及肾脏功能损害 | √ | √ | √ |
| **血脂** | 1.血清总胆固醇测定 | 脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等 | √ | √ | √ |
| | 2.血清甘油三脂测定 | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因 | √ | √ | √ |
| | 3.血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化 | √ | √ | √ |
| | 4.血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素 | √ | √ | √ |
| | 6.血清载脂蛋白A1测定 | 载脂蛋白A1水平与冠心病呈负相关；载脂蛋白B与动脉粥样硬化呈正相关； | √ | √ | √ |
| | 7.血清载脂蛋白B测定 | | √ | √ | √ |
| **糖尿病相关项目** | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | √ | √ | √ |
| | 糖化血红蛋白 | 可反映检查前1-2个月的血糖水平，是糖尿病的筛查指标 | √ | √ | √ |
| **甲状腺功能5项** | 血清三碘甲状腺原氨酸测定、血清甲状腺素测定、血清促甲状腺激素测定、血清游离甲状腺素测定、血清游离三碘甲状腺原氨酸 | 诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病 | √ | √ | √ |
| **心肌酶3项** | 血清肌酸激酶测定、血清乳酸脱氢酶测定、血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | | √ | √ | √ |
| **超敏C反应蛋白** | | 可提示有无原发性肝癌，生殖腺胚胎性肿瘤，肝硬化等。 | √ | √ | √ |
| | 甲胎蛋白检测定 | | √ | √ | √ |
| | 癌胚抗原检测定 | 为广谱肿瘤标志物，可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | √ | √ | √ |
| | 总前列腺特异性抗原测定 | 前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大，前列腺炎时也可见血清PSA水平 | √ | | |
| | 游离前列腺特异性抗原测 | | √ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **肿瘤八项** | 糖链抗原125测定（女） | 是一种卵巢癌相关的肿瘤标志物 | | √ | √ |
| | 糖链抗原153测定（女） | 是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物 | | √ | √ |
| | 糖链抗原199测定 | 是一种与胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的肿瘤标志物 | √ | √ | √ |
| | 糖链抗原50测定 | 胰腺癌、结肠癌等胃肠道恶性肿瘤时可见升高 | √ | √ | √ |
| | 细胞角蛋白19片段测定 | 是非小细胞肺癌（NSCLC）的鉴别诊断，疗效监测和预后判断的重要指标 | √ | √ | √ |
| | 糖链抗原724测定 | 时胃肠道恶性肿瘤标志物，检测胃癌的指标之一，但胃肠道良性疾病也可 | √ | √ | √ |
| **彩色多普勒超声** | 肝胆脾胰肾 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。 | √ | √ | √ |
| | 甲状腺 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤 | √ | √ | √ |
| | 膀胱、输尿管 | 检查膀胱是否有结石或肿瘤等 | √ | √ | √ |
| | 前列腺 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | √ | | |
| | 乳腺 | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。 | | √ | √ |
| | 心脏彩超 | 心血管疾病的重要诊断方法。具有无创、无痛、安全方便、直观性强的特点，对瓣膜病诊断准确率较高, 对心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的诊断价值 | √ | √ | √ |
| | 子宫及附件 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊 | | √ | |
| | 颈动脉彩超 | 了解颈部血管病变，狭窄程度、颈动脉硬化和颈动脉血流情况 | √ | √ | √ |
| | 阴超（已婚项目） | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊 | | | √ |
| **CT** | 胸部CT | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | √ | √ | √ |
| **动脉硬化检测** | | 了解动脉硬化情况，对动脉硬化进行定性、筛查 | √ | √ | √ |
| **呼气C14** | 碳14尿素呼气试验 | 判断胃内有无该细菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系 | √ | √ | √ |
| **胃功能3项** | 胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ、胃蛋白酶原比值（计算值） | 检测胃粘膜功能是否正常，是否受损。判断患胃病（如萎缩性胃炎、消化性溃疡、糜烂性胃炎及胃癌）的风险 | √ | √ | √ |
| **胃泌素-17** | | G-17可以直接评估胃窦部粘膜的健康状况和间接反映胃体部粘膜的健康状况，同时可以反映胃酸水平的高低，从而对胃部疾病风险进行有效评估 | √ | √ | √ |
| **骨密度检测** | | 诊断骨质疏松，预测骨折危险性 | √ | √ | √ |
| **营养早餐** | 营养早餐 | | √ | √ | √ |
| **电子报告** | | | √ | √ | √ |

注：美兆北京地区无尿微量白蛋白和膀胱、输尿管彩超，更换NSE和经颅多普勒

# V6钻体检套餐

根据第三方服务机构业务调整，具体体检项目以实际到检落地为准

| 体检项目 | | 临床意义 | 男 | 女未婚 | 女已婚 |
|---|---|---|---|---|---|
| **一般检查** | 身高、体重、体重指数、血压、脉搏 | 体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等 | √ | √ | √ |
| **内科** | 心肺听诊、腹部触诊 | 心肺有无异常　肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | √ | √ | √ |
| **外科** | 淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、前列腺、肛门指检、 | 淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | √ | √ | √ |
| **妇科** | 常规检查 | 女性生殖器有无异常病变，有无宫颈及阴道感染 | | | √ |
| | 白带常规 | | | | √ |
| | TCT液基薄层细胞学检测（已婚项目） | 宫颈癌筛查 | | | √ |
| | HPV基因23分型（已婚项目） | 宫颈癌筛查的重要指标 | | | √ |
| **眼科** | 外眼 | 视力是否正常，眼外观是否正常，有无沙眼、结膜炎等 | √ | √ | √ |
| | 视力 | | √ | √ | √ |
| | 眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | √ | √ | √ |
| | 眼压 | 了解眼压是否正常，眼压高可能患有青光眼病 | √ | √ | √ |
| | 裂隙灯 | 检查眼角膜和晶状体有无病变（如白内障）等 | √ | √ | √ |
| **耳鼻喉检查** | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽（如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大）有无异常等 | √ | √ | √ |
| **血常规-3分类** | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。 | √ | √ | √ |
| **尿常规** | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐等 | 可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | √ | √ | √ |
| **肝功能15项** | 血清总蛋白测定、血清白蛋白测定、血清球蛋白、白蛋白/球蛋白、血清丙氨酸氨基转氨酶测定、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、天门冬氨酸/丙氨酸氨基转移酶、血清总红胆素测定、血清直接胆红素测定、血清间接胆红素、血清碱性磷酸酶测定、血清胆碱酯酶测定、血清γ-谷氨酰基转移酶测定、血清乳酸脱氢酶测定、腺苷脱氨酶 | 可提示肝胆系统疾病：急性传染性肝炎，中毒性肝炎，脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等。 | √ | √ | √ |
| **尿微量白蛋白/尿肌酐** | | 肾脏早期损伤的指标 | √ | √ | √ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **肾功能** | 血清尿素测定 | | √ | √ | √ |
| | 血清肌酐测定 | | √ | √ | √ |
| | 血清尿酸测定 | 可提示：嘌呤代谢有无异常如高尿酸血症、痛风及肾脏功能损害 | √ | √ | √ |
| | 血清胱抑素测定 | 是肾功能损害的敏感指标 | √ | √ | √ |
| **血脂** | 1.血清总胆固醇测定 | 脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等 | √ | √ | √ |
| | 2.血清甘油三脂测定 | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因 | √ | √ | √ |
| | 3.血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化 | √ | √ | √ |
| | 4.血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素 | √ | √ | √ |
| | 6.血清载脂蛋白A1测定 | 载脂蛋白A1水平与冠心病呈负相关；载脂蛋白B与动脉粥样硬化呈正相关；ApoA-1/ApoB比值＜1，是冠心病的 | √ | √ | √ |
| | 7.血清载脂蛋白B测定 | | √ | √ | √ |
| **糖尿病相关项目** | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | √ | √ | √ |
| | 糖化血红蛋白 | 可反映检查前1-2个月的血糖水平，是糖尿病的筛查指标 | √ | √ | √ |
| **甲状腺功能5项** | 血清三碘甲状腺原氨酸测定、血清甲状腺素测定、血清促甲状腺激素测定、血清游离甲状腺素测定、血清游离三碘甲状腺原氨酸 | 诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病 | √ | √ | √ |
| **心肌酶3项** | 血清肌酸激酶测定、血清乳酸脱氢酶测定、血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | | √ | √ | √ |
| **超敏C反应蛋白** | | | √ | √ | √ |
| **肿瘤12项** | 甲胎蛋白检测定 | 可提示有无原发性肝癌，生殖腺胚胎性肿瘤，肝硬化等。 | √ | √ | √ |
| | 癌胚抗原检测定 | 为广谱肿瘤标志物，可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | √ | √ | √ |
| | 总前列腺特异性抗原测定 | 前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大，前列腺炎时也可见血清PSA水平 | √ | | |
| | 游离前列腺特异性抗原测 | | √ | | |
| | 糖链抗原125测定（女） | 是一种卵巢癌相关的肿瘤标志物 | | √ | √ |
| | 糖链抗原153测定（女） | 是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物 | | √ | √ |
| | 糖链抗原199测定 | 是一种与胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的肿瘤标志物 | √ | √ | √ |
| | 糖链抗原50测定 | 胰腺癌、结肠癌等胃肠道恶性肿瘤时可见升高 | √ | √ | √ |
| | 糖链抗原242测定 | 与胰腺癌、结肠癌、胃癌等胃肠道恶性肿瘤相关，但胃肠道良性疾病也可 | √ | √ | √ |
| | 细胞角蛋白19片段测定 | 是非小细胞肺癌（NSCLC）的鉴别诊断，疗效监测和预后判断的重要指标 | √ | √ | √ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 糖链抗原724测定 | 时胃肠道恶性肿瘤标志物，检测胃癌的指标之一，但胃肠道良性疾病也可 | √ | √ | √ |
| | 恶性肿瘤特异生长因子测 | 是一种广谱肿瘤标志物等 | √ | √ | √ |
| | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | | √ | √ | √ |
| | 鳞状细胞癌相关抗原测定（SCC） | | √ | √ | √ |
| **彩色多普勒超声** | 肝胆脾胰肾 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。 | √ | √ | √ |
| | 甲状腺 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤 | √ | √ | √ |
| | 膀胱、输尿管 | 检查膀胱是否有结石或肿瘤等 | √ | √ | √ |
| | 颈动脉 | 了解颈部血管病变，狭窄程度、颈动脉硬化和颈动脉血流情况 | √ | √ | √ |
| | 心超彩超 | 心血管疾病的重要诊断方法。具有无创、无痛、安全方便、直观性强的特点，对瓣膜病诊断准确率较高, 对心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的诊断价值 | √ | √ | √ |
| | 前列腺 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | √ | | |
| | 乳腺 | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。 | | √ | √ |
| | 子宫及附件 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊 | | √ | |
| | 阴超（已婚项目） | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊 | | | √ |
| **CT** | 胸部CT | 低剂量螺旋CT(简称LDCT)扫描方案是通过优化扫描参数，改变管电流、管电压和螺距等来降低辐射剂量，胸部扫描辐射剂量仅为常规CT的20%左右。低剂量螺旋CT对肺部筛查有助于发现早期肺癌，特别是周围型肺癌，其诊出率约为胸片的10倍。因其较少的辐射剂量，有效的降低了医源性辐射引起的恶性病变的风险。 | √ | √ | √ |
| | 头部CT（瑞慈替换成腰椎CT） | CT具有扫描速度快，覆盖面积大，采集信息量多等优点，在短时间内能够对全身各脏器进行检查，可以进行多平面的重建和重组对病变达到准确的定位、定性、定量的诊断；特别是对早期病变的发现及诊断，疾病治疗后的疗效判定，良恶性病变的鉴别等有着显著的临床意义 | √ | √ | √ |
| **经颅多谱勒** | | 了解脑血流供应情况 | √ | √ | √ |
| **动脉硬化检测** | | 了解动脉硬化情况，对动脉硬化进行定性、筛查 | √ | √ | √ |
| **呼气C14** | 碳14尿素呼气试验 | 判断胃内有无该细菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 | √ | √ | √ |
| **胃功能3项** | 胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ、胃蛋白酶原比值（计算值） | 检测胃粘膜功能是否正常，是否受损。判断患胃病（如萎缩性胃炎、消化性溃疡、糜烂性胃炎及胃癌）的风险 | √ | √ | √ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **胃泌素-17** | | G-17可以直接评估胃窦部粘膜的健康状况和间接反映胃体部粘膜的健康状况，同时可以反映胃酸水平的高低，从而对胃部疾病风险进行有效评估 | √ | √ | √ |
| **骨密度检测** | | 诊断骨质疏松，预测骨折危险性 | √ | √ | √ |
| **营养早餐** | 营养早餐 | | √ | √ | √ |
| **电子报告** | | | √ | √ | √ |

红蛋白项目。